


Вирусните хепатити – тихите убийци

Проф. д-р Красимир Антонов, дмн.


Председател на Българското
дружество по гастроентерология

27 октомври 2022 г., гр. София




Обща информация

HEP B



- ДНК вирус
- Обикновено няма симптоми
- По кръвен път или чрез телесни течности
- Има ваксина
- Няма дефинитивно лечение
- Рядко хронифицира 5-10 %

HEP C



- РНК вирус
- Обикновено няма симптоми
- Предава се основно по кръвен път
- Няма ваксина
- Има дефинитивно лечение
- Обикновено хронифицира – 85 %

Начин на предаване

- Кръвопреливане/манипулации преди 1992 г.
- Хора, родени в периода 1945-1965 г. (т.нар baby boomers)
- Козметични процедури, маникюр, пиърсинг, татуировки
- Медицински процедури (стоматологични интервенции)
- МСМ
- От майка на новородено (*хепатит B*)
- По сексуален път (*много рядко при хепатит C*)
- Употреба на интравенозни наркотици



Разпространение



240 млн.¹

Хепатит Б

71 млн.¹

Хепатит С



226 000²

Хепатит Б


87 000²

Хепатит С

1. WHO global hepatitis report, 2017. *

2. Polaris Observatory, инициатива на Center for Disease Analysis (CDA Foundation)

Хронифициране



Хепатит В

5-10% от инфектираните с HBV хронифицират.

Хепатит С

80-85% от инфектираните с HCV хронифицират.

Едва 15-20% се изчистват от вируса след острата фаза.

Само около 10% от инфектираните в стадия на острър хепатит С постъпват в инфекциозните отделения и клиники.

Останалите не забелязват, че са инфектирани.

Хепатит Б и С са водеща причина за рак на черния дроб¹




1,1 млн.

Смъртни случаи
От HCV и HBV на
година в света²



3 млн.

Новоинфицирани с
HCV и HBV всяка
година в света³



1 . https://www.who.int/health-topics/hepatitis#tab=tab_1

2. GBD 2016 Causes of Death Collaborators. Lancet 2017; 390:1151–1210.

3. Global health sector strategies on, respectively, HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections for the period 2022-2030

Скрининг

Скририрането е важно, за да се открият и диагностицират пациентите понеже заболяванията в повечето случаи протича **без забележими симтоми** в началната си фаза.

HCV в България

10 %
диагностицирани

1 % Пациенти,
лекувани годишно

850 умират годишно






Хепатит Б

- Задължителна ваксинация срещу хепатит В за всички новородени след **1992 г.** в първите 24 часа след раждането.
- Препоръчително е използването на ваксината и за всички хора, които професионално или в личния си живот са застрашени от заразяване с хепатит В.
- За разлика от хепатит С, при хепатит В цялостно изчистване от целия набор вирусни частици е невъзможно на този етап.
- Нуклеозидни/нуклеотидни аналоги – първи избор на лечение.
- Нови възможности - инхибитори на HBV полимераза

Хепатит С

- От 2017 г. в България са налични безинтерферонови терапии за хепатит С.
- Лечението с новите директно действащи антивирусни средства стандартно продължава от 8 до 12 седмици, при декомпенсирана цироза може да се удължи до 16-24 седмици.
- Лечението е под формата на таблетки.
- С минимални странични ефекти.
- С над **95 %** успеваемост.

Над два пъти намаляват лекуваните пациенти от въвеждането на новите безинтерферонови терапии за хепатит С основно поради ниското ниво на скрининг



За да изпълним целта на СЗО трябва към 2020 г. да имаме новодиагностицирани **5000 души** и **4100 души** излекувани на година ¹

*Данни НЗОК, IQVIA

1. D. S. Chen at. Al. Strategies to manage hepatitis C virus infection disease burden—Volume 4, J Viral Hepat. 2017;24(Suppl. 2):44–63

Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити 2021-2025

Основна цел е намаляване смъртността от вирусни хепатити с 40% до 2024 г.

Какво е направено?

- На всеки 5 години, лицата на възраст между 40 и 60 г. имат право на бесплатно изследване за двата вируса, като направление за това се дава от общопрактикуващия лекар.
- Изследването за хепатит С се полага на всяка бременна жена, независимо от нейната възраст. Досега само хепатит В беше включен в пакета задължителни изследвания при бременност.

Какво предстои?

- **Промяна на законодателната рамка, за да се лекуват здравнонеосигурените граждани**
- Услуги по превенция, скрининг и грижи за хората, намиращи се в повишен риск от инфициране с вирусни хепатити
- Национален регистър
- Непрекъснат и безплатен достъп до допълнителна ваксинопрофилактика (иму ноглобулин) за новородените от майки с хроничен хепатит В. В момента този медикамент липсва от държавата и родителите са принудени да го закупуват от чужбина на цена около 100 евро
- Повишаване на имунизационният обхват за хепатит В при новородените, за 2018 г. той е 85.1%, при 95% през 2010 г.
- Промяна в обществени нагласи и информираност по отношение на превенцията на вирусните хепатити на индивидуално и общностно ниво и намаляване на стигмата и дискриминацията



Време е за действие!

**Every 30 seconds
someone loses
their life to
hepatitis B or C.**


**Don't Wait!
Get tested at a
health facility
near you.**



**Almost 3,000
people die from
hepatitis B and C,
every day.**

Funding hepatitis treatment and services can bring care closer to communities and save lives.



A photograph of a woman walking away from the camera down a path in a forest. She is wearing a long, flowing yellow cloak that appears to be made of autumn leaves. The path is covered in fallen leaves of various colors, including shades of brown, orange, and yellow. The background consists of tall trees with autumn foliage. The overall atmosphere is peaceful and seasonal.

Благодаря за вниманието и
нека да изпратим хепатита в
историята!